

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Е.А. НЕПОКЛОНОВ

25 СЕН 2015

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Бутофана<sup>®</sup> ор для нормализации обмена веществ, повышения продуктивности и неспецифической резистентности сельскохозяйственной птицы (организация-производитель: ООО «НИТА-ФАРМ», г. Саратов)

### I. Общие сведения

1. Бутофан<sup>®</sup> ор (Butofan ор) – добавка кормовая для нормализации обмена веществ, повышения продуктивности и неспецифической резистентности сельскохозяйственной птицы.

2. Бутофан<sup>®</sup> ор в 1 мл содержит в качестве действующих веществ - бутафосфан - 100 мг и цианокобаламин - 0,0725 мг (включая необходимую норму превышения для стабильности 0,0225 мг), в качестве вспомогательных веществ - метил-4-гидроксibenзоата - 1 мг, воды дистиллированной - до 1 мл.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, принятых в Российской Федерации.

3. Кормовая добавка по внешнему виду представляет собой прозрачный раствор от розового до розово-красного цвета.

4. Выпускают добавку расфасованной по 20 мл в стеклянные флаконы, по 100 и 500 мл в полимерные флаконы, по 1000 мл в полимерные бутылки или по 3000 и 5000 мл в полимерные канистры. Флаконы, бутылки и канистры укупоривают полимерными крышками с контролем первого вскрытия.

Каждую упаковку маркируют этикеткой на русском языке с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения добавки, состава и гарантированных показателей, срока и условий хранения, даты изготовления, объема в единице фасовки, номера партии, информации о соответствии, регистрационного номера, обозначение СТО, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°C до 25°C.

Срок хранения – 2 года со дня производства, после вскрытия флакона - не более 28 суток.

Бутофан<sup>®</sup> ор не должен применяться по истечении срока хранения.

### II. Биологические свойства

5. Входящий в состав кормовой добавки бутафосфан способствует улучшению функции печени, стимулирует метаболические процессы, повышает двигательную активность гладкой мускулатуры, стимулирует образование костной ткани.

Витамин В<sub>12</sub> активизирует процессы кроветворения, синтез нуклеиновых кислот, восстанавливает до нормы уровень лимфоцитов-супрессоров, участвует в синтезе метионина, способствует образованию гликогена, мобилизует запасы энергии, необходимые для образования дезоксирибозы и синтеза ДНК.

Кормовая добавка Бутофан® ор нормализует метаболические и регенеративные процессы, оказывает стимулирующее действие на белковый, углеводный и жировой обмен веществ, повышает резистентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды, способствует росту и развитию молодняка животных.

### III. Порядок применения

6. Кормовую добавку Бутофан® ор применяют сельскохозяйственной птице для нормализации обмена веществ, повышения продуктивности и неспецифической резистентности, в том числе:

- для повышения сохранности поголовья, в том числе при расклеве;
- для повышения сопротивляемости организма к заболеваниям различной этиологии и неблагоприятным факторам внешней среды, в том числе к тепловому стрессу;
- для нормализации функций печени, белкового, углеводного и жирового обмена веществ, регенеративных процессов;
- для повышения продуктивности, стимуляции роста и развития молодняка, улучшения качества яйца.

7. Кормовую добавку применяют птице перорально с водой для поения в течение 4—5 дней подряд, в разовых дозах:

- курам-несушкам, бройлерам 2,0 - 3,0 мл на 1 л питьевой воды;
- цыплятам, ремонтному молодняку 1,0 - 1,5 мл на 1 л питьевой воды;
- цыплятам-бройлерам 20 мл на 1 л питьевой воды для снятия теплового стресса.

8. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией не выявлено. Противопоказания не установлены.

9. Кормовая добавка совместима с другими кормовыми добавками и лекарственными препаратами.

10. Продукцию от сельскохозяйственных животных и птиц после применения Бутофана® ор можно использовать в пищевых целях без ограничений.

### IV. Меры личной профилактики

11. При работе с Бутофаном® ор следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

12. При попадании кормовой добавки в глаза, их следует немедленно промыть большим количеством воды.

13. Кормовую добавку следует хранить в местах недоступных для детей.

Инструкция разработана компанией ООО «НИТА-ФАРМ» г. Саратов.

Адрес организации - производителя: 410010, Россия, г. Саратов ул. им. Осипова В.И, д. 1.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Бутофана ор, утвержденная Россельхознадзором 2 августа 2013 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер: ПЗР-2-17.13/02935