

ИНСТРУКЦИЯ по применению Цефакара

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Цефакар (Cefacarium).
- 1.2. Препарат представляет собой суспензию красновато-коричневого цвета со специфическим запахом, при хранении разделяющуюся на два слоя, легко перемешивающуюся при встряхивании.
- 1.3. В 100,0 см³ препарата содержится: 10,0 см³ каролина (0,2% масляный раствор β-каротина), 1,5 г цефазолина натриевой соли и вспомогательных веществ и наполнителей до 100,0 см³.
- 1.4. Препарат выпускают в полимерной таре по 500,0 и 1000,0 см³.
- 1.5. Цефакар хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 5 до плюс 25 °С.
- 1.6. Срок годности 18 месяцев.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- 2.1. Цефакар обладает широким спектром противомикробного действия, способствует регенерации слизистой оболочки матки и восстановлению сократительной функции матки коров, больных послеродовым гнойно-катаральным эндометритом.
- 2.2. Механизм действия цефазолина натриевой соли заключается в нарушении синтеза микробной стенки. Цефазолин оказывает бактерицидное действие, высокоэффективен против грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, включая продуцирующие β-лактамазу, особенно в отношении стафилококков, стрептококков, *Escherichia coli*. и протей. Препарат не активен против микоплазм, хламидий, риккетсий, эймерий, актиномицетов и вирусов. β-каротин способствует регенерации эндометрия, оказывает противовоспалительное действие, способствует повышению тонуса матки.
- 2.3. Цефакар малотоксичен, не обладает кумулятивным действием, выделяется из организма с мочой в неизменном виде.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

- 3.1. Цефакар применяют для лечения коров, больных послеродовыми эндометритами. С этой целью препарат предварительно подогревают до температуры 35-40 °С, тщательно взбалтывают содержимое флакона и вводят внутриматочно в дозе 15-20 см³ на 100 кг массы животного с интервалом 48 часов до выздоровления.
- 3.2. Не рекомендуется применение препарата при повышенной чувствительности животных к антибиотикам цефалоспоринов.
- 3.3. Убой на мясо разрешается не ранее чем через 48 часов, а использование молока в пищу людям через 12 часов после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя ранее указанного срока мясо используют на корм плотоядным животным.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

- 4.1. При работе с препаратом необходимо соблюдать меры личной профилактики, как при работе с малотоксичными препаратами.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1. В случае возникновения осложнений после применения препарата его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения соответствия нормативным документам.

6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1. Общество с ограниченной ответственностью «Белкаролин» Республика Беларусь, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81.

Инструкция по применению препарата разработана сотрудником УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» доцентом кафедры фармакологии и токсикологии Петровым В.В., сотрудницей ООО «Белкаролин» нач. ОТК Перловой О.В.

